

[Ufur cap 友復膠囊 ] - [Tegafur/Uracil ]

藥師                      藥劑部藥師 發佈日期                      2011/10/10

**<藥物效用>**

治療胃、肺、乳房、大腸、結腸、頭頸部鱗狀上皮等腫瘤

**<服藥指示>**

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

**<注意事項>**

- 1.請定期檢查肝功能及血球值
- 2.若發生黃膽、嚴重腹瀉、出血症狀請聯絡醫師藥師

**<其他注意事項>**

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物（包含處方藥、非處方藥及中藥）。

**<副作用>**

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：  
白血球減少、肝功能指數上升、食慾不振、胃腸不適、頭痛
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

**<藥品外觀>**

白色/白色，長圓柱形，硬膠囊；大小：1 號；標記：[UFUR][UFUR]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。