

# Scody1® 速可淨 20000PPM(2%氟)高氟塗佈凝膠使用方法



## • 適用對象

☆鼻咽喉癌/頭頸部接受放射線治療的病友                      ☆一般牙周病治療後的患者

☆牙齦萎縮，齒根明顯外露者

☆牙齒有明顯對冷熱刺激敏感之患者

## • 為何要用高氟牙膠？

病友唾液腺功能在放射線照射後，其分泌功能會降低，嚴重者甚至會完全沒有唾液的分泌。當唾液變得稀少口乾，口腔黏膜常有紅腫、發炎及疼痛，而導致病友們咀嚼吞嚥困難，以及防衛與抗菌能力下降。唾液無法中和及清除口內細菌產生之酸性物質，口腔內酸鹼值(PH)會降低至 5.5 以下，牙齒容易被細菌所產生酸侵蝕而行程齲齒(蛀牙)及牙髓損傷。每天定期讓氟膠與牙齒有效地接觸，不但可以減少牙齒在放射線治療後對溫度變化的過度敏感，更能降低齲齒(蛀牙)的發生。

此外，病人除可經常使用 [Scody1 速可淨\(不含酒精\)漱口水](#)，可以減緩口腔粘膜發炎疼痛的症狀，三餐飯後還可搭配 [Scody1 速可淨成人牙膏\(膠\)](#) 使用，對牙齒的過敏及牙周病控制更有效果。

## • 使用方法

1. 一星期至少使用三次，病情嚴重者可增加使用次數。
2. 睡前先將牙齒刷淨，然後依醫師指示將適量 [Scody1 漱口淨高氟塗佈凝膠](#) 放入氟托(Tray/載氟器)內。

3. 把氟托裝載於牙齒上，輕咬氟托以防脫出，將氟膠滲入牙縫以增加與牙齒接觸的面積。
4. 裝載氟托時盡量少吞口水，以避免將氟膠大量吞服，產生不必要的噁心症狀。
5. 約 4~5 分鐘後取下氟托，並將口中多餘之氟膠及口水吐出，若感覺噁心或不適時可以用清水漱口。
6. 一般建議使用後二小時內不要吃東西，睡覺前使用最佳。

- **備註**

- 使用後若有不適症狀，請盡快與您牙科醫師聯絡。

含氟量超過 1500PPM 為要用牙膏(膠)，需經醫師指示使用。

麗汝齒股份有限公司服務專線：(02) 8227-1789

衛署藥製字第 044377 號

**台北醫學大學·部立雙和醫院牙科部 關心您的健康**

聯絡電話 (02) 2249-0088 分機 2554