

口腔手術(拔牙)後應注意事項




口腔手術(拔牙)後應注意事項

1. 請緊咬紗布，一小時後自行取出，若繼續出血可令咬紗布一小時，如再滲血且血色鮮濃，請與醫師聯絡，若僅為口水略帶血色並不代表凝血問題，不必驚慌。
2. 咬紗布期間，請勿吐口水、說話、吸煙，帶麻醉藥劑效用消失後始可進食，食物切忌過熱，勿飲酒及劇烈運動。
3. 手術後若有顏面腫脹或疼痛，二十四小時內可用冰袋冰敷，每次二十分鐘，休息十分鐘後，再繼續冰敷，四十八小時後改熱敷。
4. 為避免拔牙後牙齒異位造成齙齒及牙周病，依個月後需裝置假牙，已恢復美觀及功能。

缺牙後遺症

1. 鄰接牙齒傾斜→容易造成：牙周病。
2. 食物容易嵌塞→容易造成：齙齒、牙髓炎。
3. 對咬牙齒增長→容易造成：咬合干擾及顛頷關節病變。
4. 長期單側咀嚼→容易造成：單側肌肉肥大脸型不對稱。



缺牙的裝置方式

1. 固定牙橋：將鄰近兩顆牙齒磨小裝置一組 3~4 顆牙橋。

如圖之下方係缺牙兩旁予以消磨後的狀態，其上端三顆連結一起的牙套及為




「牙橋」，製作完成後依箭頭方向載入下方的支柱牙。

2. 活動假牙：以網架牙鉤及樹脂基底所組成的活動假牙



3. 人工植牙：在缺牙區植入人工牙根以代替缺失的牙齒



台北醫學大學·部立雙和醫院牙科部 關心您的健康

聯絡電話(02) 2249-0088 分機 2554