

發表醫師 發佈日期 2013/12/12

### 什麼是疝氣？

疝氣是器官或組織進入不正常的位置，嬰幼兒及孩童最常見的是腹股溝疝氣；亦即在靠近鼠蹊部的位置會看到有一突起的腫塊形成原因？

小兒腹股溝疝氣形成原因係因先天性腹膜鞘狀突退化不全，致使腹腔與腹股溝甚至陰囊間形成一開放性的通道，開口小，只有腹水可通過時，形成陰囊積水；開口較大，腸子進入則形成疝氣。

一般而言，會墜入疝氣囊中的內容物以小腸為主，但女生則可能有卵巢及輸卵管卡入的可能

### 臨床上會有何症狀？

較大的小孩會在腹股溝看見鼓出的腫塊，通常在孩童腹部用力時會更加明顯，有時也伴有腹部不適的感覺。

嬰幼兒除了腹股溝腫塊以外也常伴隨有哭鬧或吐奶。若是單純的陰囊水腫則表現為在陰囊有一照光後呈現透明的水囊。

### 會造成什麼危險？

腹股溝疝氣所產生最可怕的併發症為箱閉性疝氣，即腸子或卵巢卡入疝氣囊中推不回去。

此種併發症約50%發生於六個月以下的小嬰兒。時間一久，箱閉的腸子或卵巢可能發生壞死，則須要進行緊急手術，將卡住的器官進行復位或將已壞死的部份切除。

### 如何治療？

小兒腹股溝疝氣在臨牀上確診後即可安排時間進行手術治療，單純的陰囊水腫則可等到一歲時若未自行消退再以手術處理。

現今小孩疝氣手術的麻醉方式為全身麻醉，是相當安全的。所以若家屬懷疑小孩有腹股溝疝氣的可能性，應儘早就醫以利早期治療

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。