

病灶內注射治療術後注意事項

一、 目的：

將藥物直接注入皮膚病灶內，以達消炎止痛，消腫退紅，病灶變小或其他治療效果。

二、 適應症：

嚴重青春痘，蟹足腫，肥厚性疤痕，圓禿，乾癬，節結性瘡疹，嚴重慢性濕疹，表皮囊腫，黏液囊腫，血管瘤或肉芽組織等皮膚病灶……等。

三、 可能之副作用：

- 1.注射部位局部暫時之疼痛或點狀出血
- 2.甚少病人再多次注射後有注射部位皮膚變薄或萎縮之情形
- 3.極少數可能有局部感染發炎紅腫，若是注射後仍有此現象務必提早回診
- 4.膚色較深之病患接受注射後可能會有局部膚色改變之現象
- 5.對注射藥物過敏反應

四、 治療反應與追蹤：

- 1.多數病灶在接受數次注射治療後，可達消炎消腫退紅或病灶變小等其他治療效果。
- 2.若病灶處有注射後新產生之紅腫熱痛或其他任何不適症狀，請盡早就醫回診。
- 3.若病灶大小厚度已達明顯改善，將由醫師判定是否停止注射而改用其他局部或口服藥物治療，以避免注射部位皮膚變薄或萎縮之情形。

護理部 編印
諮詢電話：22490088-2381

臺北醫學大學・部立雙和醫院護理部內部文件，未經書面同意禁止翻印