

散瞳注意事項—兵役檢查

我們用散瞳劑將瞳孔放大，使視力檢查結果較客觀，整個過程約需 1 小時。

點藥方法為連續點 3 次，每次間隔 5 分鐘。

3 次點藥後，請在外等候 50 分鐘，再進行 1 次電腦驗光。

藥效可以維持 6~8 個小時

在這 6~8 個小時內，瞳孔放大，看近會模糊，看遠則正常。

在這 6~8 個小時後，便可正常看近及看遠。

臺北醫學大學·部立雙和醫院 103.11.C

FH3300003

諮詢電話：22490088 轉 1111

臺北醫學大學·部立雙和醫院護理部內部文件，未經書面同意禁止翻印

散瞳注意事項—兵役檢查

我們用散瞳劑將瞳孔放大，使視力檢查結果較客觀，整個過程約需 1 小時。

點藥方法為連續點 3 次，每次間隔 5 分鐘。

3 次點藥後，請在外等候 50 分鐘，再進行 1 次電腦驗光。

藥效可以維持 6~8 個小時

在這 6~8 個小時內，瞳孔放大，看近會模糊，看遠則正常。

在這 6~8 個小時後，便可正常看近及看遠。

臺北醫學大學·部立雙和醫院 103.11.C

FH3300003

諮詢電話：22490088 轉 1111

臺北醫學大學·部立雙和醫院護理部內部文件，未經書面同意禁止翻印

散瞳注意事項—兵役檢查

我們用散瞳劑將瞳孔放大，使視力檢查結果較客觀，整個過程約需 1 小時。

點藥方法為連續點 3 次，每次間隔 5 分鐘。

3 次點藥後，請在外等候 50 分鐘，再進行 1 次電腦驗光。

藥效可以維持 6~8 個小時

在這 6~8 個小時內，瞳孔放大，看近會模糊，看遠則正常。

在這 6~8 個小時後，便可正常看近及看遠。

臺北醫學大學·部立雙和醫院 103.11.C

FH3300003

諮詢電話：22490088 轉 1111

臺北醫學大學·部立雙和醫院護理部內部文件，未經書面同意禁止翻印