

# 認識 Port-A 及照顧須知



衛教手冊編輯委員會

## ． 什麼是 PORT-A-CATH 內植視輸液管

Port-A-Cath 是一種人工血管，為需要長期及重複輸注射藥物、血液、高營養液或其他液體的患者，且可避免競賣重複穿刺造成的感染或不適，所設計的一種植入體內的矽質導管，在管路無感染及阻塞的情形之下一般可長期留置。



圖：植入皮下 Port-A 的外觀

## ． 植入 PORT-A-CATH 所需的手術

一般植入的方式一作用可分為靜脈內、動脈內、腹腔內及硬脊膜。植入手術是在開刀房內進行，醫師會先幫你麻醉，然後將 Port-A-Cath 完全植入所需作用的系統及皮下。一般化療病人多植於靜脈內系統，固定於胸前鎖骨下的胸壁，皮膚外觀通常有道傷口（約 5-7 公分），裝置 Port-A-Cath 的地方約有十元硬幣大小之圓形突起。

（如下圖）



## • 手術後的自我照顧

1. 術後會照 X 光片，以確定人工血管的裝置是在正確位置。
2. 手術後傷口會用紗布覆蓋，護理人員會每天視情況決定是否需要換藥。
3. 待開始插入蝴蝶彎針後，會使用通氣膠布覆蓋，一般 7 天換要一次。
4. 傷口未痊癒時，不可泡澡或弄濕傷口，應保持傷口清潔乾燥。
5. 每日注意傷口是否有紅、腫、熱、滲血、疼痛及肢體水腫情形，若有上述情形，應告知醫護人員。
6. 手術後約 7-10 天即可拆線；如傷口不需拆線及換藥，可貼妥美容膠，不要刻意撕除，讓其自行掉落。

## • 使用期間注意事項

1. 手術後三天，若傷口無特殊情形就可開始注射藥物；有時在醫師允許情況下手術後當天即可使用。
2. 護理人員會從 Port-A-Cath 突起的地方插入一個專用的蝴蝶彎針，並會定期對插針的地方做換藥，蝴蝶彎針每七天會換新一個。
1. 為避免注射點滴時管線牽扯而導致滑脫，可使用安全別針將點滴管固定於衣服上。
2. 當有疼痛、出血、滲漏及腫脹情形，應立即告知醫護人員。

## • 返家後注意事項

1. 應隨時注意植入人工血管周圍的皮膚，若有紅、腫、熱、通、出血、異常分泌物及發燒感染情形時，須立即返院檢查。
2. 為避免移位，裝置植入同側之手臂勿作過度運動：如 360 度旋轉、激烈的擴胸運動、提重物、舉重、打高爾夫球及避免碰撞人工血管，一般日常活動則不受影響，但勿直接按壓裝置部位。
3. 定期回診檢查及以抗凝血劑沖洗導管以免阻塞，一般靜脈植入者每四週沖洗一次，動脈植入者每週沖洗一次。



圖：沖洗導管

- 裝置人工血管 PORT-A 的費用

在符合健保規定下，目前裝置的費用不需自行負擔。

臺北醫學大學 部立雙和醫院 關心您