

臺北醫學大學 100 學年度碩士班暨碩士在職專班招生入學考試

□腔顎面外科學試題

本試題第1頁；共2頁
(如有缺頁或毀損，應立即請監試人員補發)

注
意
事
項

- 一、本試題共二大題，共計 100 分。
- 二、請將正確答案依題次作答於答案用卷內。
- 三、試題答錯者不倒扣；題次號碼錯誤或不按順序或鉛筆作答，不予計分。

一、問答題(共 50%)

1. 糖尿病患者接受手術，在安排及照護上的注意事項為何？(15%)
2. 請說明頸部淋巴廓清術(radical neck dissection)的分類，手術範圍及特點？(15%)
3. 病患若有服用類固醇藥物(corticosteroid)在手術安排及照護上要特別注意哪些事？(10%)
4. 請問膿瘍侵犯到以下組織間隙時，應從何處切開進行手術引流？(10%)

二、選擇題(每題 2.5%，共 50%)

1. 當患者被懷疑有顴骨弓骨折，選擇下列何種 X 光照法最易診斷？
Ⓐ Waters' view Ⓑ Townes' view Ⓒ Submental vertex Ⓓ Panoramic view
2. 植牙手術中，軟組織移植之敘述中，何者不正確？
Ⓐ 移植組織必須有良好的固定 Ⓑ 接受部位之血液供應必須良好
Ⓒ 厚度要足夠，以免二度收縮 Ⓓ 厚度要薄，可增加存活率
3. 顏面組織傷口縫合後，如果張力不大，應考慮縫合後幾天拆線，減少臉部的“斑馬線”的標記？
Ⓐ 1 天 Ⓑ 4 天 Ⓒ 7 天 Ⓓ 14 天
4. 口竇相通(oroantral communication)的開口大小為 2 至 6 mm 時，應如何處置？
Ⓐ 告知上顎竇預防措施，密切觀察即可
Ⓑ 以八字型縫合傷口，給予抗生素及鼻黏膜收縮劑(nasal decongestant)，並請病患遵循上顎竇預防措施
Ⓒ 以島瓣(flap)手術閉合開口
Ⓓ 施行 Caldwell-Luc Operation
5. 人類口腔中的大唾液腺，哪一個腺體的分泌主要是以粘液為主？
Ⓐ 腮腺 Ⓑ 舌下腺 Ⓒ 頷下腺 Ⓓ 亞伯納氏腺(Ebner's gland)
6. Odontogenic keratocyte 較一般的齒源性囊腫有較高的復發率，下列敘述何者錯誤？
Ⓐ 因囊腫較薄，不易完整刮除
Ⓑ 在囊腫周邊有 daughter cyst
Ⓒ 在囊腫周邊有 remnant of dental lamina
Ⓓ 與 Gorlin's syndrome 有關的 cysts 較少見 daughter cyst
7. 植牙手術時，有關切線的設計何者正確？
Ⓐ 一般條件良好的病例可以作 crestal incision Ⓑ 下顎後牙區切線可以偏向舌側
Ⓒ 上顎前牙區的切線可以偏向唇側 Ⓓ 上顎後牙區的切線可以偏向頰側
8. 屬於頸部後三角區底部的淋巴結稱為？
Ⓐ 橫頸淋巴鏈(transverse cervical chain) Ⓑ 副淋巴鏈(accessory chain)
Ⓒ 鎖骨上淋巴鏈(supraclavical chain) Ⓓ 頸淋巴鏈(jugular chain)
9. 除了上下顎阻生智齒外第三種常見的阻生齒是？
Ⓐ 下顎犬齒 Ⓑ 上顎贅生齒 Ⓒ 上顎犬齒 Ⓓ 下顎小白齒
10. 一般而言對骨質較少，必須以側位開窗法所進行之上顎竇昇高術(sinus lift)後，多久可以進行人工牙根之植入手術？
Ⓐ 1-2 個月 Ⓑ 3-6 個月 Ⓒ 7-12 個月 Ⓓ 12 個月以上

臺北醫學大學 100 學年度碩士班暨碩士在職專班招生入學考試

口腔顎面外科學試題

本試題第2頁；共2頁
(如有缺頁或毀損，應立即請監試人員補發)

11. 有關正顎手術之治療時機與矯正問題下列敘述何者正確？
Ⓐ 由於對生長發育的新觀念，正顎手術宜於生長高峰前及早進行
Ⓑ 進行分析時上下顎骨之水平生長差異與垂直生長差異同等重要
Ⓒ 男女性之生長發育高峰及停止時期接近所以手術時機不應有性別之考量
Ⓓ 以上皆非
12. 放射線治療之所以用於治療惡性腫瘤是基於以下何種原因？
Ⓐ 腫瘤的部位
Ⓑ 腫瘤的大小異常
Ⓒ 腫瘤是處於快速生長的時期
Ⓓ 腫瘤較正常組織更容易死亡
13. 根據 UICC 於口腔鱗狀細胞癌之分類標準：一個位於右側舌根部僅 2.5 公分大小之口腔癌腫塊，但在對側(左)深頸部有一 2 公分大小之轉移淋巴腫塊，且合併有肺部轉移，下列那一期是正確的？
Ⓐ T2N1M0
Ⓑ T1N1M1
Ⓒ T2N2M1
Ⓓ T2N2M0
14. 軟組織癒合初期形成的膠原蛋白是第幾型？
Ⓐ 第一型
Ⓑ 第二型
Ⓒ 第三型
Ⓓ 第四型
15. 以耳前切線作顫顎關節手術時，可能會損傷到哪些神經？
(1) 顏面神經
(2) 耳顫神經
(3) 淺顫神經
(4) 大耳神經
Ⓐ 只有(1)
Ⓑ 只有(1)+(2)
Ⓒ 只有(1)+(2)+(3)
Ⓓ (1)+(2)+(3)+(4)
16. 有關口腔顏面區之感染，以下何者說明比較適合？
Ⓐ 以格蘭氏陽性菌[Gram(+) bacteria]中的金黃色葡萄球菌(Staphylococcus)較多
Ⓑ 乾性齒槽炎(dry socket)以盤尼西林(penicillin)為用藥首選(drug of choice)
Ⓒ Metronidazole 或 clindamycin 皆能有效治療厭氧菌感染
Ⓓ 若影響到 buccal space 須從口外清創方能引流乾淨
17. 關於上顎正顎手術，何者為對？
Ⓐ 上唇愈薄，其會與硬組織一起移動量愈少
Ⓑ 避免鼻翼基部變寬，需使用羊腸線將兩側基部縫合在一起
Ⓒ 截斷的骨段向上移(impaction)時，上唇易往前移
Ⓓ 截斷的骨段向前移時，鼻尖會因前鼻棘(anterior nasal spine)壓迫而向下
18. 關於口腔癌手術中顎骨的處理，下列敘述何項正確？
Ⓐ 切除時必需保留下齒槽神經，以免患者術後麻木
Ⓑ 進行口底部腫瘤切除時可先將下顎骨截斷，待腫瘤切除完後再行復位及固定
Ⓒ 術後若需進行放射線治療，則下顎骨固定以金屬材質優先考慮
Ⓓ 腫瘤已侵犯骨質時，為病患生活品質著想仍以邊緣骨切除術(marginal resection)優先考慮
19. 顎骨囊腫如需使用抽吸幫忙診斷時，下列何者為是？
Ⓐ 若抽吸物為空氣時則可能是外傷性骨囊腫(traumatic bone cyst)
Ⓑ 若抽吸物為清澈稻草色時則可能是角化上皮囊腫(odontogenic keratocyst)
Ⓒ 若抽吸物為血紅色且會主動將空針推開時則可能是血管瘤(hemangioma)
Ⓓ 若抽吸物為血紅色且不會主動將空針推開則可能是巨細胞肉芽腫(giant cell granuloma)
20. 拔除第三大白齒的時期為白齒牙根形成至下列何者？
Ⓐ 少於 1/3
Ⓑ 1/3 至 2/3
Ⓒ 2/3 至完全成形
Ⓓ 完全成形