

開腹手術病人止痛劑要求時疼痛程度及相關因素之探討.

**Postoperative Pain When Analgesic (Demerol)
Required and Its Related Factor among Abdominal
Surgical Patients**

翁麗雀;鄭綺

摘要

本研究在探討開腹手術病人手術後 24 小時內止痛劑(demerol)要求（注射劑量、次數及間隔時間）、疼痛程度（疼痛強度、疼痛感覺、情感表現）及影響因素。以立意取樣法選取 60 位接受開腹手術後病人，其中 50 位在手術後 24 小時內要求注射止痛劑，另外 10 位未曾要求。以修正後之 MPQ-SF 疼痛評估表評值手術後 24 小時內要求止痛劑之疼痛程度。研究結果顯示病人在手術後 24 小時內要求 demerol 注射之平均劑量為 158.4mg，平均次數為 3.2 次，平均注射間隔時間為 427.4 分。平均疼痛強度 76.8、疼痛感覺 7.1、疼痛情感表現 7.7。而疼痛強度及疼痛感覺是病人手術後 24 小時內是否要求 demerol 注射最有效的預測變項，正確預估率為 90%。而疼痛情感表現是手術後第二天是否再要求注射 demerol 之預測變項，正確預估率為 68%。

Abstract